

# 予防接種の対象と接種回数、接種間隔一覧

R6.3 修正

		対象年齢	接種回数 および 接種間隔		
5種混合		2ヵ月以上7歳6ヵ月未満	初回：3週間以上の間隔で3回 追加：初回免疫3回目終了後6ヵ月以降で1回 標準として初回免疫後6ヵ月から18ヵ月を経過した時期		他の 予防 接種 を受け る 場合  接種 間隔 の 制限 は あり ませ ん
4種混合		2ヵ月以上7歳6ヵ月未満	初回：3週間以上の間隔で3回 追加：初回免疫3回目終了後12～18ヵ月の間に1回		
ヒブワクチン	開始年齢	2ヵ月以上7ヵ月未満	初回：3回 追加：1回	初回：4週間以上の間隔 追加：初回免疫終了後7ヵ月以上の間	
		7ヵ月以上 12ヵ月未満	初回：2回 追加：1回	生後1年までに初回接種が終わらなければ、初回の最後から4週間あけて追加接種を行う。	
		1歳以上5歳未満	1回		
小児肺炎球菌 ワクチン	開始年齢	2ヵ月以上7ヵ月未満	初回：3回 追加：1回	初回：4週間以上の間隔 追加：初回免疫3回目終了後2ヵ月以上あけて1歳～1歳3ヵ月の間	
			生後2年以内に初回3回接種すること。ただし、生後1年を超えて2回目を接種した場合は、3回目の接種はしない。		
		7ヵ月以上 12ヵ月未満	初回：2回 追加：1回	初回：4週間以上の間隔 追加：初回免疫2回目終了後2ヵ月以上あけて1歳以降	
			生後2年以内に初回2回接種すること。		
		1歳以上2歳未満	初回：1回 追加：1回	追加：初回免疫終了後2ヵ月以上	
2歳～4歳	1回				
二種混合		小学6年生	1回（対象者には個別案内しています）		
B型肝炎 ワクチン		生後8週以降1歳未満 標準的な期間 〔生後2ヵ月から生後9ヵ月まで〕	3回	2回目：1回目接種後4週間以上あける 3回目：1回目終了後20週以上あける ※1歳以降（誕生日当日から）は全額自己負担	
日本脳炎	第Ⅰ期	6ヵ月以上 90ヵ月未満	初回：2回	2回目：1回目から1～4週間の間隔をあける ※初回接種は標準的に、3歳以上4歳に達するまでの間行う。	
			追加：1回 （3回目）	3回（追加）：2回目から6ヵ月以上間隔をあける ※標準的には2回目からおおむね1年あけて、4歳以上5歳に達するまでの間に接種する。	
	第Ⅱ期	9歳以上 13歳未満の間	1回 （4回目）	※標準的には9歳以上10歳に達するまでに接種する。	

子宮頸がん ワクチン	小学6年生～高校1年生 推奨する接種年齢: 中学1年生		2回 (初回15歳未満)	シルガード	2回目: 初回接種後6ヵ月あける
			3回 (初回15歳以上)		2回目: 初回接種後2ヵ月あける 3回目: 初回接種後6ヵ月あける
インフルエンザ	生後6ヵ月以上		生後6ヵ月～小学生		医療機関により1～2回 ※助成あり
			中学生～高校生(18歳相当)		1回 ※助成あり
			65歳以上		1回 ※全額自己負担
			19歳～64歳		1回 ※全額自己負担
高齢者肺炎球菌 ワクチン	年度内に65歳以上の人		1回 ※上限3,000円まで助成あり(生涯に1度のみ)		
BCG	生後1年未満 標準的な接種期間 生後5ヵ月～8ヵ月未満		1回(本別町では7ヵ月健診で接種します)		
麻しん風しん	I期	12ヵ月以上 24ヵ月未満	1回		
	II期	小学校就学前の 1年間にある者			
水痘	12ヵ月以上36ヵ月未満		2回	1回目: 生後12ヵ月から生後15ヵ月の間 2回目: 1回目の接種後から3ヵ月以上あける ※標準的には1回目の接種後6ヵ月から12ヵ月まで経過した時期	
ロタウイルス ワクチン (ロタリックス)	生後6週から 24週までの乳児		2回	2回目: 初回接種後4週間以上の間隔をあけて生後24週までに完了させる	
おたふく	1歳から		1回 (2回)	1回目: 1歳以降に接種 2回目: 5歳以上7歳未満 ※日本小児科学会のスケジュールを参考 (定期接種ではないため) ※全額自己負担 R6.4月現在 国保: 4,500円 循列: 5,800円	

注射生ワクチンを受ける場合 4週間あける