

予防接種の対象と接種回数、接種間隔一覧

R2.3修正

		対象年齢	接種回数 および 接種間隔	
不活化ポリオワクチン		3ヵ月以上7歳5ヵ月未満 (3ヵ月以上12ヵ月未満)	初回：3週間以上の間隔で3回 追加：初回免疫3回目終了後12～18ヵ月の間に1回	
四種混合		3ヵ月以上7歳5ヵ月未満	初回：3週間以上の間隔で3回 追加：初回免疫3回目終了後12～18ヵ月の間に1回	
ヒブワクチン	開始年齢	2ヵ月以上7ヵ月未満	初回：3回 追加：1回	初回：4週間以上の間隔 追加：初回免疫終了後7ヵ月以上の間
		7ヵ月以上 12ヵ月未満	初回：2回 追加：1回	生後1年までに初回接種が終わらなければ、初回の最後から4週間あけて追加接種を行う。
		1歳以上5歳未満	1回	
小児肺炎球菌ワクチン	開始年齢	2ヵ月以上7ヵ月未満	初回：3回 追加：1回	初回：4週間以上の間隔 追加：初回免疫3回目終了後2ヵ月以上あけて1歳～1歳3ヵ月の間
			生後2年以内に初回3回接種すること。ただし、生後1年を超えて2回目を接種した場合は、3回目の接種はしない。	
		7ヵ月以上 12ヵ月未満	初回：2回 追加：1回	初回：4週間以上の間隔 追加：初回免疫2回目終了後2ヵ月以上あけて1歳以降
			生後2年以内に初回2回接種すること。	
1歳以上2歳未満	初回：1回 追加：1回	追加：初回免疫終了後2ヵ月以上		
2歳～4歳	1回			
二種混合	小学6年生	1回（対象者には学校を通じて案内しています）		
B型肝炎ワクチン	生後8週以降1歳未満 標準的な期間 生後2ヵ月から生後9ヵ月まで	3回	2回目：1回目接種後4週間以上あける 3回目：1回目終了後20週以上あける ※1歳以降（誕生日当日から）は全額自己負担	
日本脳炎	第Ⅰ期	6ヵ月以上 90ヵ月未満	初回：2回	2回目：1回目から1～4週間の間隔をあける ※初回接種は標準的に、3歳以上4歳に達するまでの間行う。
			追加：1回 (3回目)	3回(追加)：2回目から6ヵ月以上間隔をあける ※標準的には2回目からおおむね1年あけて、4歳以上5歳に達するまでの間に接種する。
	第Ⅱ期	9歳以上 13歳未満の間	1回 (4回目)	※標準的には9歳以上10歳に達するまでに接種する。

他の予防接種を受ける場合は1週間あける

子宮頸がん ワクチン	小学6年生～高校1年生 推奨する接種年齢:中学1年生	3回	ガーダシル	2回目:初回接種後2ヵ月あける 3回目:初回接種後6ヵ月あける	
インフルエンザ	生後6ヵ月以上	生後6ヵ月～小学生	2回	※助成あり	
		中学生～18歳	1回	※助成あり	
		65歳以上			
		19歳～64歳	1回	※全額自己負担	
高齢者肺炎球菌 ワクチン	年度内に65歳以上の人	1回	※上限3,000円まで助成あり(生涯に1度のみ)		
BCG	生後1年未満 〔標準的な接種期間〕 生後5ヵ月～8ヵ月未満	1回(本別町では7ヵ月健診で接種します)			
麻疹風しん	I期	12ヵ月以上 24ヵ月未満	1回		
	II期	小学校就学前の 1年間にある者			
水痘	12ヵ月以上36ヵ月未満	2回	1回目:生後12ヵ月から生後15ヵ月の間 2回目:1回目の接種後から3ヵ月以上あける ※標準的には1回目の接種後6ヵ月から12ヵ月まで経過した時期		
ロタウイルス ワクチン (ロタリックス)	生後6週から 24週までの乳児	2回	2回目:初回接種後4週間以上の間隔をあけて生後 24週までに完了させる ※全額自己負担		
おたふく	1歳から	1回 (2回)	1回目:1歳以降に接種 2回目:5歳以上7歳未満 ※日本小児科学会のスケジュールを参考 (定期接種ではないため) ※全額自己負担		

4週間あける