

予防接種の対象と接種回数、接種間隔一覧

R3.9修正

	対象年齢		接種回数 および 接種間隔		
不活化ポリオ ワクチン	3ヵ月以上7歳5ヵ月未満 (3ヵ月以上 12 ヶ月未満)		初回： 3 週間以上の間隔で 3 回 追加：初回免疫3回目終了後 12～18 ヶ月の間に 1 回		他 の 予 防 接 種 を 受 け る 場 合 は 1 週 間 あ け る
四種混合	3ヵ月以上7歳5ヵ月未満		初回：3 週間以上の間隔で 3 回 追加：初回免疫 3 回目終了後 12～18 ヶ月の間に 1 回		
ヒブワクチン	開 始 年 齢	2ヵ月以上7ヵ月未満	初回：3 回 追加：1 回	初回：4 週間以上の間隔 追加：初回免疫終了後 7 ヶ月以上の間	
		7ヵ月以上 12 ヶ月未満	初回：2 回 追加：1 回	生後 1 年までに初回接種が終わらなければ、初回 の最後から 4 週間あけて追加接種を行う。	
		1 歳以上5歳未満	1 回		
小児肺炎球菌 ワクチン	開 始 年 齢	2ヵ月以上7ヵ月未満	初回：3 回 追加：1 回	初回：4 週間以上の間隔 追加：初回免疫 3 回目終了後 2 ヶ月以上あけ て 1 歳～1 歳 3 ヶ月の間	
			生後2年以内に初回3回接種すること。ただし、生後1年を超え て2回目を接種した場合は、3回目の接種はしない。		
		7ヵ月以上 12 ヶ月未満	初回：2 回 追加：1 回	初回：4 週間以上の間隔 追加：初回免疫 2 回目終了後 2 ヶ月以上あけ て 1 歳以降	
			生後2年以内に初回2回接種すること。		
		1 歳以上 2 歳未満	初回：1 回 追加：1 回	追加：初回免疫終了後 2 ヶ月以上	
		2 歳～4 歳	1 回		
二種混合	小学6年生		1 回（対象者には学校を通じて案内しています）		
B型肝炎 ワクチン	生後8週以降1歳未満 標準的な期間 〔生後2ヵ月から生後9ヵ月まで〕		3回	2回目：1 回目接種後4週間以上あける 3回目：1 回目終了後20週以上あける ※1 歳以降（誕生日当日から）は全額自己負担	
日本脳炎	第 Ⅰ 期	6ヵ月以上 90ヵ月未満	初回：2回	2 回目：1 回目から 1 ～4 週間の間隔を あける ※初回接種は標準的に、3 歳以上 4 歳に達す るまでの間行う。	
			追加：1 回 (3回目)	3 回(追加)：2 回目から 6 ヶ月以上間隔を あける ※標準的には 2 回目からおおむね 1 年あけ て、4 歳以上 5 歳に達するまでの間に接種 する。	
	第 Ⅱ 期	9 歳以上 13 歳未満の間	1 回 (4回目)	※標準的には 9 歳以上 10 歳に達するまで に接種する。	

子宮頸がん ワクチン	小学6年生～高校1年生 推奨する接種年齢:中学1年生		3回	ガーダシル	2回目:初回接種後2ヵ月あける 3回目:初回接種後6ヵ月あける	
インフルエンザ	生後6ヵ月以上		生後6ヵ月～小学生		医療機関により1～2回 ※助成あり	
			中学生～高校生(18歳相当)		1回 ※助成あり	
			65歳以上			
			19歳～64歳		1回 ※全額自己負担	
高齢者肺炎球菌 ワクチン	年度内に65歳以上の人		1回 ※上限3,000円まで助成あり(生涯に1度のみ)			
BCG	生後1年未満 〔標準的な接種期間〕 生後5ヵ月～8ヵ月未満		1回(本別町では7ヵ月健診で接種します)			4 週 間 あ け る
麻疹風しん	I期	12ヵ月以上 24ヵ月未満	1回			
	II期	小学校就学前の 1年間にある者				
水痘	12ヵ月以上36ヵ月未満		2回	1回目:生後12ヵ月から生後15ヵ月の間 2回目:1回目の接種後から3ヵ月以上あける ※標準的には1回目の接種後6ヵ月から12ヵ月まで経過した時期		
ロタウイルス ワクチン (ロタリックス)	生後6週から 24週までの乳児		2回	2回目:初回接種後4週間以上の間隔をあけて生後 24週までに完了させる ※全額自己負担		
おたふく	1歳から		1回 (2回)	1回目:1歳以降に接種 2回目:5歳以上7歳未満 ※日本小児科学会のスケジュールを参考 (定期接種ではないため) ※全額自己負担		